

## PÍ SOMNÁ I NFORMÁC I A PRE POUŽ ÍVATEĽA

# Patentblau V

Liečivo: Ceruleum protectum V (sal natricum)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Patentblau V a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Patentblau V
3. Ako používať Patentblau V
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Patentblau V
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### 1. ČO JE PATENTBLAU V A NA ČO SA POUŽ ÍVA

Patentblau V je farbivo na zobrazenie lymfatických ciev.

Patentblau V je neaktívna látka používaná na označovanie lymfatických ciev a lymfatických uzlín pred kontrastnou rádiografiou (lymfografiou). Modré farbivo sa injekčne podáva pod kožu na vizualizáciu lymfatických ciev, aby sa do jednej z nich mohla zaviesť kontrastná látka. Keďže časť farbiva vstrebajú a vylúčia lymfatické cievy, po približne desiatich minútach sa stávajú viditeľnými.

### 2. ČO POTREBUJETE VEDI EŤ SKÔR, AKO POUŽ IJETE PATENTBLAU V

#### Nepoužívajte Patentblau V

- ak ste precitlivý na Patentblau V alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
- ak viete, že ste precitlivý na trifenylnmetánové farbivá
- ak ste tehotná

#### Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, než začnete používať Patentblau V:

- ak trpíte na alergie, astmu (bronchiálnu astmu) alebo ak často prichádzate do kontaktu s trifenylnmetánovými farbivami, napr. v potravinách alebo kozmetike.

Môžete byť precitlivý na Patentblau V. Pred podaním Patentblau V dôkladne prediskutujte vaše alergie so svojim lekárom.

#### Iné lieky a Patentblau V

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane tých, ktorých výdaj nie je viazaný na lekárske predpis, povedzte to svojmu lekárovi. Obzvlášť informujte svojho lekára ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali lieky na srdcové poruchy a poruchy krvného tlaku ako sú beta-blokátory.

#### Patentblau V a jedlo a nápoje a alkohol

Opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, či pred použitím Patentblau V smiete piť alebo jesť.

#### Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom predtým, než začnete užívať tento liek.

Bezpečnosť používania Patentblau V počas tehotenstva nebola preukázaná. V dôsledku toho sa používanie Patentblau V počas tehotenstva neodporúča.

Nie je známe, či sa Patentblau V vylučuje do materského mlieka. Ak máte dostať injekciu Patentblau V kvôli rádiografii, v rámci opatrenia prerušte dojčenie na 48 hodín.

Pri užívaní akéhokoľvek lieku počas tehotenstva alebo dojčenia sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

### Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak sa po použití Patentblau V necítite dobre, nemali by ste viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.

## 3. AKO POUŽÍVAŤ PATENTBLAU V

Patentblau V podáva injekčne pod kožu lekár alebo člen zdravotníckeho personálu.

### Odporúčané dávky:

Po lokálnej anestézii sa zvyčajne podáva 1 až 10 ml Patentblau V pod kožu. Zvyčajné miesto vpichu je priehlavok alebo ruka.

### Ak použijete viac Patentblau V ako máte

Patentblau V vám injekčne podá pod kožu lekár alebo člen zdravotníckeho personálu. Je preto nepravdepodobné, že vám bude podané nadmerné množstvo. Neboli hlásené žiadne predávkovania.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.

## 4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

### *Vedľajšie účinky*

Závažné reakcie precitlivenosti - anafylaktický šok

- nauzea alebo vracanie, sucho v ústach, pálenie jazyka, poruchy videnia, akútne respiračné ťažkosti a problém s koncentráciou. Môžu sa vyskytnúť kožné reakcie, svrbenie a pupence. Vo vážnych prípadoch môže dôjsť k obehovému šoku s orgánovým zlyhaním a dokonca k obehovému kolapsu.

Vyššie spomenuté vedľajšie účinky môžu byť život ohrozujúce. Pri prvom príznaku reakcie precitlivenosti sa musí podávanie lieku okamžite zastaviť. V takomto naliehavom prípade podnikne všetky potrebné opatrenia ošetrojúci lekár.

### **Ďalšie vedľajšie účinky**

žihľavka (urtikária), ťažkosti s dýchaním spojené s kašľom (bronchospazmus), náhly opuch tváre a krku (angioedém), zmena sfarbenia kože v mieste vpichu (na modro).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

## 5. AKO UCHOVÁVAŤ PATENTBLAU V

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou <alebo domovým odpadom>. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.>

### Podmienky na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C na suchom mieste.

## 6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

### Čo Patentblau V obsahuje

Liečivo je Patentblau V sodná soľ (E131) : 0,05 g na 2 ml ampulku.

Ďalšie zložky sú: Chlorid sodný, dihydrát hydrofosforečnanu sodného a voda na injekciu.

## Ako vyzerá Patentblau V a obsah balenia

Patentblau V je číry modrý roztok v bezfarebných sklenených liekovkách typu I.

Veľkosti balenia: jedno balenie obsahuje 5 ampuliek, každá obsahuje 2 ml roztoku na injekciu.

## Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Guerbet  
BP 57400  
95943 Roissy CdG Cedex  
France

Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledovnými názvami:

Patentblau V 25 mg/ml : Nemecko

Patentblau V : Slovensko

Bleu Patenté V sodique Guerbet 2,5% : Francúzsko

Bleu Patenté V 2,5 g/100 ml : Belgicko, Luxembursko

Patentblue 25 mg/ml : Maďarsko

Bleu Patente V 25 mg/ml : Holandsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v máji 2012.